

CABINETS VETERINAIRES DE PONTRIEUX ET LANVOLLON

Drs SAVELS, GENTY, HERMANN,
HAMEL et GAILLARD
Kermanac'h Z.A. des Fontaines
22260 PLOÉZAL 22290 LANVOLLON
Tél. : 02.96.95.60.06 Tél. : 02.96.65.35.89

VETARMOR



Votre chiot vient pour la première fois chez le vétérinaire



L'identification (tatouage ou puce électronique)

Elle est **obligatoire** depuis 1999. En cas de **perte** de votre chien, l'identification permet de vous contacter par téléphone ou par courrier.

Vaccination

Il est important de le vacciner contre des **maladies graves ou transmissibles à l'homme** (leptospirose, rage)

La **primo-vaccination** se déroule en **2 injections** à 1 mois d'intervalle, puis **tous les ans** pendant toute la vie de votre chien.

Vermifuge

Les chiots sont souvent contaminés par les vers. Une bonne vermifugation permet une **bonne croissance**, évite les **diarrhées et vomissements** d'origine parasitaire.

Il est nécessaire de le faire tous les mois jusqu'à ses 6 mois, puis 2 à 4 fois par an selon son mode de vie.

Les différents vaccins

C : Maladie de carré (maladie virale grave, très contagieuse)

H : Hépatite de Rubarth (maladie virale induisant une insuffisance hépatite grave)

P : Parvovirose (diarrhée hémorragique grave très contagieuse)

Pi : Virus de la toux de chenil (trachéobronchite contagieuse)

L : Leptospirose (infection bactérienne induisant une insuffisance rénale et/ou hépatique grave)

R : Rage (attesté par un passeport européen)



Un ver



Une puce



Un acarien



Une tique

Antipuces

Il existe des antipuces en **pipettes** ou en **comprimés**. Certains font aussi les tiques ou les acariens. Tous fonctionnent pendant **un mois**.



Stérilisation

Les **avantages** de la stérilisation sont multiples et sont optimisés si elle a lieu avant la puberté : à **6 mois**. Elle permet de prévenir :

- ⊗ Les **gestations** inattendues ;
- ⊗ Les **fugues** lorsque les femelles sont en chaleurs ;
- ⊗ Les **tumeurs et maladies** induites par les hormones sexuelles (tumeurs mammaires, infection de l'utérus, trouble de la prostate, etc.).

Dans ce cas une modification de l'alimentation est nécessaire pour prévenir le surpoids.